

GLOSARIO LEQEMBI®

Ya seas paciente o cuidador, es probable que durante las visitas médicas o en el resto de tu recorrido de aprendizaje con LEQEMBI te hayas topado con muchas palabras técnicas y nuevos términos relacionados con el Alzheimer. Por eso este glosario de términos de uso frecuente puede ser muy útil en tu camino.

ACERCA DE LA AFECCIÓN



Deterioro cognitivo leve (DCL) producido por el Alzheimer

Mild cognitive impairment (MCI) due to Alzheimer's disease

Una de las etapas tempranas del Alzheimer en la que los síntomas pueden ser sutiles e incluir hacer la misma pregunta varias veces u olvidarse de acudir a citas importantes. 1 de cada 3 personas con deterioro cognitivo leve producido por el Alzheimer desarrolla demencia en un plazo de 5 años.



Demencia leve producida por el Alzheimer

Mild dementia due to Alzheimer's disease

Una de las etapas tempranas del Alzheimer en la que los síntomas pueden ser más evidentes e incluir pérdida de la memoria que perturba algunas actividades diarias, dificultad para completar tareas conocidas o confusión con fechas, horas y lugares.



Progresión del Alzheimer

Alzheimer's disease progression

Cuando los síntomas, como olvidarse fechas y acontecimientos, problemas para recordar palabras o dificultad para realizar tareas familiares, pueden empeorar.

TÉRMINOS QUE DEBES CONOCER



Proteína amiloide

Amyloid protein

La proteína amiloide es una sustancia que se acumula continuamente en el cerebro y que forma la placa cerebral amiloide dañina. Existen diferentes tipos de proteínas amiloides y todas ellas pueden causar daños a las células cerebrales.



Placa cerebral amiloide

Amyloid brain plaque

Cuando se unen fragmentos de proteínas amiloides en el cerebro, se forma la placa cerebral amiloide. La acumulación de placa amiloide en el cerebro puede dificultar la comunicación entre las células cerebrales. Mientras más se deteriora la comunicación entre las células cerebrales, más difícil se vuelve el trabajo de esas células.

Consulta la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 y 4. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el [Recuadro de ADVERTENCIA](#) y la [Guía del Medicamento](#).



AIRA (anomalías de imagen relacionadas con el amiloide)

AIRA (amyloid-related imaging abnormalities)

AIRA es un posible efecto secundario de tratamientos como LEQEMBI. Suele considerarse como una inflamación temporal en ciertas zonas del cerebro que normalmente se resuelve con el tiempo. Algunas personas también pueden tener pequeños puntos de sangrado dentro o sobre la superficie cerebral y, con poca frecuencia, pueden producirse áreas más grandes de sangrado.



Gen ApoE4

ApoE4 gene

Un gen que puede poner a las personas en mayor riesgo de sufrir un efecto secundario llamado AIRA (anomalías de imagen relacionadas con el amiloide). Tu proveedor de atención médica puede hacerte una prueba para ver si tienes este gen. Al comprender tu riesgo, puedes prepararte mejor para el tratamiento con LEQEMBI.

EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS



Examen de imágenes por resonancia magnética (IRM)

Magnetic resonance imaging (MRI) scan

Un examen que toma una imagen detallada de tu cerebro para que la revise tu proveedor de atención médica.



Examen del líquido cefalorraquídeo (LCR)

Cerebrospinal fluid (CSF) test

Una prueba que toma muestras del líquido que rodea al cerebro y la médula espinal para comprobar la presencia de las proteínas amiloides que se acumulan en la placa cerebral de amiloide.



Tomografía por emisión de positrones del amiloide (TEP)

Amyloid positron emission tomography (PET) scan

Esta prueba utiliza una máquina especial que toma imágenes de tu cerebro para comprobar si hay placa cerebral de amiloide.



Evaluación de demencia clínica (EDC)

Clinical dementia rating (CDR)

Una herramienta que mide la progresión del Alzheimer preguntando a las personas cómo este afecta distintas capacidades como: recordar, permanecer activo, orientación (saber por dónde vas), completar tareas diarias, resolver problemas y hacer actividades de forma independiente. No se ha demostrado que LEQEMBI influya individualmente en cada una de estas capacidades.



Infusión intravenosa

Intravenous (IV) infusion

La infusión intravenosa es un método para inyectar líquidos en el que se coloca una aguja en una vena del brazo, para así administrar un medicamento.

¿QUÉ ES LEQEMBI?

LEQEMBI es un medicamento recetado que se utiliza para tratar a personas con la enfermedad de Alzheimer.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD



¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre LEQEMBI?

LEQEMBI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **AIRA (anomalías de imagen relacionadas con el amiloide). Normalmente no hay señales de AIRA, pero en casos raros, puede conducir a complicaciones graves**
- El AIRA puede manifestarse como inflamación en partes del cerebro o pequeños puntos de sangrado
- Pueden producirse áreas más grandes de hemorragia en el cerebro, pero esto es infrecuente
- El AIRA suele desaparecer con el tiempo
- La mayoría de las personas con AIRA no tienen ningún síntoma. Sin embargo, algunas personas pueden sentir:



dolor de cabeza



náuseas



confusión que empeora



problemas para caminar



mareos



convulsiones



problemas de visión



Algunas personas tienen un gen llamado ApoE4 que puede aumentar el riesgo de AIRA. Consulte a su proveedor de atención médica sobre realizarse pruebas para ver si tiene este gen



Algunos medicamentos pueden aumentar el riesgo de desarrollar áreas más grandes de hemorragia en el cerebro en personas que toman LEQEMBI. Consulte a su proveedor de atención médica para ver si alguno de los medicamentos que está tomando aumenta este riesgo



Su proveedor de atención médica le pedirá que se realice una IRM (imagen por resonancia magnética) para detectar AIRA, antes de que comience a tomar LEQEMBI y durante su tratamiento



Llame a su proveedor de atención médica o acuda inmediatamente a la sala de emergencias del hospital más cercano si tiene alguno de los síntomas mencionados anteriormente.

Si ha tenido reacciones alérgicas graves a cualquiera de los ingredientes de LEQEMBI, usted no debería ser tratado con LEQEMBI.



Antes de recibir LEQEMBI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted:

- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si LEQEMBI podría causarle daño a su bebé en gestación. Informe a su proveedor de atención médica si queda embarazada durante su tratamiento con LEQEMBI
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si los ingredientes de LEQEMBI pasan a la leche materna. Consulte a su proveedor de atención médica acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé mientras usted recibe LEQEMBI

Consulta el resto de la Información Importante de Seguridad en la página 4. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el [Recuadro de ADVERTENCIA](#) y la [Guía del Medicamento](#).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)



Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con o sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Especialmente, informe a su proveedor de atención médica si toma medicamentos para prevenir la formación de coágulos de sangre (como la aspirina). Si no está seguro, consulte a su proveedor de atención médica para obtener una lista de estos medicamentos.

Haga una lista de los medicamentos que toma. Muestre la lista a su proveedor de atención médica y al farmacéutico cuando le receten un nuevo medicamento.



¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LEQEMBI?

LEQEMBI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **AIRA (anomalías de imagen relacionadas con el amiloide) (ver la página 3)**
- **Reacciones alérgicas graves** que pueden producirse durante las infusiones de LEQEMBI. Informe a su proveedor de atención médica si nota cualquiera de estos síntomas durante o después de una infusión de LEQEMBI:



hinchazón de la cara, los labios, la boca o la lengua



protuberancias que causan comezón en la piel, también conocidas como ronchas



dificultad para respirar



- Las **reacciones relacionadas con la infusión** son frecuentes y a veces pueden ser graves. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si nota cualquiera de estos síntomas durante las infusiones:



fiebre



mareos o aturdimiento



síntomas similares a los de la gripe (escalofríos, dolores articulares y corporales, temblores)



ritmo cardíaco rápido o lento, o sentir como si está palpitando el pecho



náuseas o vómitos



dificultad para respirar o falta de aliento

Su proveedor de atención médica puede administrarle medicamentos antes de su próxima infusión para reducir la probabilidad de que sufra una reacción.



Entre los efectos secundarios más frecuentes de LEQEMBI, se incluyen los siguientes:

- reacciones relacionadas con la infusión
- inflamación en áreas del cerebro, con o sin pequeños puntos de sangrado en la superficie del cerebro (AIRA)
- dolor de cabeza



Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LEQEMBI. Llame al médico para obtener más información y asesoramiento acerca de los efectos secundarios. Se le recomienda que reporte los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulta el resto de la Información Importante de Seguridad en la página 3. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).