

# TARJETA DE BILLETERA LEQEMBI®



Es importante que todos tus proveedores de atención médica conozcan los medicamentos que estás tomando. **Llevar esta tarjeta a las citas puede ayudar a informarles de que estás recibiendo LEQEMBI.**



**Instrucciones:** imprime y recorta esta tarjeta, luego guárdala en tu billetera, bolsa o libro de citas. Muéstrasela a todos tus proveedores de atención médica, incluyendo médicos, enfermeros, neurólogos, radiólogos y otros especialistas que puedas consultar.



**ESTOY RECIBIENDO LEQEMBI®  
SEGÚN LA PRESCRIPCIÓN DEL/DE LA**

DR./DRA. \_\_\_\_\_

Lleva esta tarjeta contigo y muéstrasela a todos tus proveedores de atención médica para que sepan que estás recibiendo LEQEMBI.



## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

LEQEMBI puede provocar efectos secundarios graves, incluyendo anomalías de imagen relacionadas con el amiloide o "AIRA." Los síntomas incluyen dolor de cabeza, confusión, mareos, problemas de visión, náuseas, problemas para caminar y convulsiones. Además, durante las infusiones de LEQEMBI se ha producido hinchazón de la cara, los labios, la boca o la lengua, ronchas y dificultad para respirar.

Esta no es una lista completa de todos los posibles efectos secundarios. Lea la Información de Prescripción completa, incluyendo el Recuadro de ADVERTENCIA y la Guía del Medicamento en LEQEMBI.com/es.



© 2024 Eisai Inc. y Biogen.  
LEQE-US3529 junio de 2024



Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. LEQEMBI® es una marca comercial registrada de Eisai R&D Management Co., Ltd.



Corta a lo largo de la línea punteada y pliega por la mitad.

## ¿QUÉ ES LEQEMBI?

LEQEMBI es un medicamento recetado que se utiliza para tratar a personas con la enfermedad de Alzheimer.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

**¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre LEQEMBI?**

LEQEMBI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **AIRA (anomalías de imagen relacionadas con el amiloide).** Normalmente no hay señales de AIRA, pero en casos raros, puede conducir a complicaciones graves
- El AIRA puede manifestarse como inflamación en partes del cerebro o pequeños puntos de sangrado
- Pueden producirse áreas más grandes de hemorragia en el cerebro, pero esto es infrecuente
- El AIRA suele desaparecer con el tiempo
- La mayoría de las personas con AIRA no tienen ningún síntoma. Sin embargo, algunas personas pueden sentir:
  - dolor de cabeza
  - náuseas
  - confusión que empeora
  - problemas para caminar
  - mareos
  - convulsiones
  - problemas de visión
- Algunas personas tienen un gen llamado ApoE4 que puede aumentar el riesgo de AIRA. Consulte a su proveedor de atención médica sobre realizarse pruebas para ver si tiene este gen

- Algunos medicamentos pueden aumentar el riesgo de desarrollar áreas más grandes de hemorragia en el cerebro en personas que toman LEQEMBI. Consulte a su proveedor de atención médica para ver si alguno de los medicamentos que está tomando aumenta este riesgo
- Su proveedor de atención médica le pedirá que se realice una IRM (imagen por resonancia magnética) para detectar AIRA, antes de que comience a tomar LEQEMBI y durante su tratamiento

**Llame a su proveedor de atención médica o acuda inmediatamente a la sala de emergencias del hospital más cercano si tiene alguno de los síntomas mencionados en el lado izquierdo de la página.**

**Si ha tenido reacciones alérgicas graves a cualquiera de los ingredientes de LEQEMBI, usted no debería ser tratado con LEQEMBI.**

**Antes de recibir LEQEMBI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted:**

- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si LEQEMBI podría causarle daño a su bebé en gestación. Informe a su proveedor de atención médica si queda embarazada durante su tratamiento con LEQEMBI
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si los ingredientes de LEQEMBI pasan a la leche materna. Consulte a su proveedor de atención médica acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé mientras usted recibe LEQEMBI

Consulta la Información Importante de Seguridad en el presente documento. Haz clic en los enlaces para ver la [Información de Prescripción completa](#), el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).

## **INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)**

**Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma**, incluidos los medicamentos con o sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Especialmente, informe a su proveedor de atención médica si toma medicamentos para prevenir la formación de coágulos de sangre (como la aspirina). Si no está seguro, consulte a su proveedor de atención médica para obtener una lista de estos medicamentos.

Haga una lista de los medicamentos que toma. Muestre la lista a su proveedor de atención médica y al farmacéutico cuando le receten un nuevo medicamento.

### **¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LEQEMBI?**

**LEQEMBI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:**

- **AIRA (anomalías de imagen relacionadas con el amiloide) (ver la página 1)**
- **Reacciones alérgicas graves** que pueden producirse durante las infusiones de LEQEMBI. Informe a su proveedor de atención médica si nota cualquiera de estos síntomas durante o después de una infusión de LEQEMBI:
  - hinchazón de la cara, los labios, la boca o la lengua
  - protuberancias que causan comezón en la piel, también conocidas como ronchas
  - dificultad para respirar

- Las **reacciones relacionadas con la infusión** son frecuentes y a veces pueden ser graves. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si nota cualquiera de estos síntomas durante las infusiones:

- fiebre
- síntomas similares a los de la gripe (escalofríos, dolores articulares y corporales, temblores)
- náuseas o vómitos
- mareos o aturdimiento
- ritmo cardíaco rápido o lento, o sentir como si está palpitando el pecho
- dificultad para respirar o falta de aliento

Su proveedor de atención médica puede administrarle medicamentos antes de su próxima infusión para reducir la probabilidad de que sufra una reacción.

### **Entre los efectos secundarios más frecuentes de LEQEMBI, se incluyen los siguientes:**

- reacciones relacionadas con la infusión
- inflamación en áreas del cerebro, con o sin pequeños puntos de sangrado en la superficie del cerebro (AIRA)
- dolor de cabeza

**Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LEQEMBI. Llame al médico para obtener más información y asesoramiento acerca de los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088.**